

A photograph of three black cows grazing in a lush green field. The cows are positioned in the lower half of the frame, with the background showing rolling green hills under a bright sky. The text is overlaid on the middle of the image.

จากลูกโคหย่านมถึงโคอายุหนึ่งปี: วงจรชีวิตของโคทางภาคเหนือ

☐ ARTICLE | 3 MIN READ

วงจรชีวิตวัวในออสเตรเลียตอนเหนือ



เดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน (ของปีเดียวกัน)

วงจรเริ่มต้นใหม่

หลังจากลูกวัวเกิดมาได้ประมาณ 2-3 ปี วัวสาวที่ถูกคัดเลือกไว้เพื่อเป็นแม่พันธุ์จะถูกนำไปเข้าสู่ฝูงผสมพันธุ์ และวงจรการเลี้ยงก็จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

การตอนวัวหลังฤดูแล้ง


การเติบโตจนพร้อมขาย

หลังจากฤดูแล้ง ฟาร์มจะทำการตอนวัวเพื่อตรวฉบับและคัดแยก โดยวัวตัวผู้ที่ถูกตอน (Steers) และวัวสาว (Heifers) ที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกไว้เป็นแม่พันธุ์ จะถูกเลี้ยงต่อให้โตเป็นวัววัยรุ่น (Yearlings) เพื่อเพิ่มน้ำหนัก

น้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับขายขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด

- วัวที่ส่งออกแบบมีชีวิต (Live Export): ส่วนใหญ่จะถูกเลี้ยงต่อในฟาร์มเดิม หรือส่งไปยังฟาร์มที่จัดไว้สำหรับการขุนวัวอายุน้อย
- วัวที่ไม่ได้ส่งออกแบบมีชีวิต: จะถูกส่งไปฟาร์มขุน (Feedlots) หรือฟาร์มในภาคใต้เพื่อเลี้ยงต่อจนโตเต็มที่

การขายวัวเข้าสู่ตลาดส่งออกแบบมีชีวิตเกิดขึ้นตลอดทั้งปี แต่จะมากที่สุดในช่วงฤดูแล้ง เพราะเป็นช่วงที่มีการตอนวัวและจัดการเพื่อขาย



ตลอดทั้งปี

การผสมพันธุ์

เนื่องจากพื้นที่เลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือของออสเตรเลียมีขนาดใหญ่และกว้างขวาง วัวตัวผู้จะอยู่ร่วมกับวัวแม่พันธุ์ตลอดทั้งปี ทำให้ลูกวัวสามารถเกิดได้ทุกช่วงเวลา

ซึ่งแตกต่างจากระบบการผลิตในภาคใต้ของออสเตรเลีย ที่จะปล่อยให้วัวตัวผู้ผสมพันธุ์กับตัวเมียเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปคือฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิ


ฤดูฝนหรือเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน

(ช่วงฝน = ช่วงเวลาการเจริญเติบโตของหญ้า/ทุ่งหญ้า และฤดูใบไม้ร่วง)

ลูกวัวที่เกิดและการเลี้ยงดู

ลูกวัวส่วนใหญ่ในภาคเหนือของออสเตรเลียจะเกิดในช่วง ฤดูฝน ซึ่งตรงกับฤดูร้อนของออสเตรเลีย ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการผสมพันธุ์สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี ลูกวัวจึงเกิดและถูกเลี้ยงดูได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน



ฤดูแล้ง

เดือนเมษายน – พฤศจิกายน (ของปีเดียวกัน)

การหย่านม (Weaning)

ในช่วงฤดูแล้ง ฟาร์มจะทำการตอนวัวเพื่อตรวฉบับและจัดการ โดยปกติจะทำปีละประมาณ 2 ครั้ง

เมื่อถึงเวลานี้ ลูกวัวจะถูกหย่านมจากแม่ จัดรวมเป็นฝูง และเลี้ยงต่อเพื่อเพิ่มน้ำหนักจนถึงระดับที่ขายได้ ซึ่งอาจเลี้ยงต่อในฟาร์มเดิมหรือส่งไปยังพื้นที่อื่นเพื่อขุนให้โต



คำศัพท์สำคัญ

Cows: แม่วัวที่เคยคลอดลูกแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

Heifer: วัวสาวที่ยังไม่เคยตั้งท้อง

Calf / Calve: ลูกวัว

Weaner: ลูกวัวที่หย่านมจากแม่แล้ว

Yearling: วัวหย่านมที่โตขึ้นจนเป็นวัยรุ่น

Steer: วัวตัวผู้ที่ถูกตอนแล้ว

Bull: วัวตัวผู้ที่ยังไม่ถูกตอน

Dry Season: ฤดูแล้งในภาคเหนือของออสเตรเลีย ระหว่างเดือน เมษายนถึงพฤศจิกายน ซึ่งไม่มีฝนตก

Wet Season: ฤดูฝนในภาคเหนือของออสเตรเลีย ระหว่างเดือน พฤศจิกายนถึงเมษายน ซึ่งมีฝนตกหนักและหญ้าเจริญเติบโตมากที่สุด