




DARI SAPI MUDA HINGGA SAPI BERUMUR SATU TAHUN:

SIKLUS HIDUP SAPI DI WILAYAH
UTARA

📖 ARTICLE | 3 MIN READ

Siklus hidup sapi di Australia Utara



April hingga November (tahun yang sama)

Siklus dimulai lagi

Dua hingga tiga tahun setelah kelahiran, sapi betina yang dipertahankan di stasiun menjadi pengganti memasuki kawanan pembiakan dan siklus itu dimulai lagi.

Pengumpulan pasca musim kemarau

Perkembangan dan peralihan tahap hewan

Semua sapi jantan dan sapi betina, yang tidak dipelihara untuk bergabung dengan kawanan pembiakan sebagai pengganti, akan bertransisi menjadi sapi muda seiring pertumbuhan dan penambahan berat badan mereka.

Pasar akhir akan menentukan bobot akhir mereka. Sebagian besar sapi muda yang ditujukan untuk pasar ekspor ternak hidup akan dibesarkan di lahan yang sama tempat mereka dilahirkan, atau di lahan lain yang khusus digunakan untuk membesarkan sapi muda.

Sapi-sapi yang tidak dijual ke pasar ekspor ternak hidup akan diangkut ke tempat penggemukan sapi atau lokasi lain di selatan untuk dimatangkan.

Peralihan ke pasar ekspor ternak hidup terjadi sepanjang tahun, meskipun biasanya, titik tertinggi dalam setahun adalah selama musim kemarau ketika pengumpulan dan pemrosesan ternak untuk dijual terjadi.

Glosarium

Sapi: Sapi betina yang telah melahirkan satu anak sapi atau lebih

Sapi betina: seekor sapi betina muda yang belum mengandung anak sapi

Anak sapi/anak sapi: Bayi

Sapih: Anak sapi yang telah 'disapih' dari ketergantungan induknya

Yearling: Anak sapi yang sudah bertransisi menjadi remaja

Steer: Jantan yang dibeiri

Banteng: Jantan yang dibeiri seluruhnya atau tidak dibeiri

Musim Kemarau: Periode waktu antara bulan April – November pada tahun yang sama di Australia Utara dimana tidak ada hujan

Musim Hujan: Periode waktu antara bulan November dan April di Australia Utara ketika hujan monsun turun dan pertumbuhan rumput/padang rumput mencapai puncaknya

Sepanjang tahun

Perkawinan (konsepsi)

Karena sifat stasiun yang luas dan luas serta tanah di Australia utara, sapi jantan kawin dengan sapi betina sepanjang tahun, yang berarti anak sapi dapat lahir kapan saja sepanjang tahun.

Hal ini berbeda dengan sistem produksi di Australia Selatan di mana sapi jantan hanya akan dikawinkan dengan sapi betina pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, biasanya musim gugur dan musim semi.

Musim hujan atau November hingga April

(Periode hujan = waktu pertumbuhan rumput/padang rumput dan musim gugur)

Anak sapi yang lahir dan dibesarkan

Mayoritas anak sapi di Australia utara akan lahir selama 'musim hujan' yang terjadi selama musim panas di Australia dan antara bulan November hingga April.

Meskipun pembuahan dapat terjadi kapan saja sepanjang tahun, anak sapi dilahirkan dan dibesarkan sepanjang tahun.

Musim kemarau

April – November (tahun yang sama)

Penyapihan

Pada musim kemarau, stasiun akan mengumpulkan properti, biasanya dua kali setiap tahun.

Setelah selesai, anak sapi akan disapih dari induknya, dikelompokkan bersama, dan dibesarkan di lahan yang sama atau diangkut ke lokasi lain untuk menambah berat badan dan mencapai berat yang siap dijual.

