




# チェーンのロックを 解除

ラム肉サプライチェーンをマスターするためのガイド

📖 ARTICLE | 3 MIN READ

# 子羊のライフサイクル



以下の情報は、子羊と羊の生産の基本的なタイムラインです。月ごとに概説されています

## 9月から11月 (オーストラリアの春)

草が生育し、子羊も入手可能

春になると、オーストラリアの牧草地は最も速く成長します。

そのため、9月から11月の春の間に子羊は離乳し、体重が増え始めます。春は子羊の成長率が最も高くなります。

春には子羊の供給が最も多くなります。

## 春の剪毛と剪毛

秋に毛刈りをしなかった羊は春に毛刈りをします。秋に毛刈りをした羊は春にクラッチングを行います。クラッチングとは、フライストライクのリスクを減らすために羊の毛を部分的に刈る作業です。

## 6月から7月 (オーストラリアの冬)

生まれ育った子羊（供給不足の時期）

子羊は6月と7月に生まれます。この時期には、生まれたばかりでまだ離乳していない子羊がほとんど売れません。そのため、オーストラリアの冬は子羊の供給が最も逼迫します。

同様に、冬の間は雌羊が子羊を育てているため、羊肉はあまり売れません。

## 1月と2月 (オーストラリアの夏)

受胎

1月と2月には、雌羊（母羊）が妊娠します。羊の妊娠期間は5ヶ月です。1月と2月に妊娠した子羊は、同年の6月と7月に生まれます。

オーストラリアでは、ラム肉は夏の料理とされています。

## 2月と5月 (オーストラリアの夏と秋)

子羊の販売

前年の冬に生まれた子羊が市場に出回ります。生後6～10ヶ月です。春から夏にかけて体重が増えています。

農作物も栽培している混合農場では、農作物を植えるスペースを確保するために秋に子羊を販売します。

## 3月から5月 (オーストラリアの秋)

秋の毛刈り

メリノ種は、羊毛のために飼育される羊の品種です。オーストラリアの成体の雌羊の70%以上がメリノ種です。メリノ種の毛刈りは秋または春に行われます。秋の毛刈りは3月から5月の間に行われます。

